



承認番号	カプセル50mg	16200EMZ01861000
	カプセル100mg	16200EMZ01862000
	細粒50mg	16200EMZ01860000
薬価収載	1987年8月	
販売開始	1987年9月	
再審査結果	1996年12月	
再評価結果	2004年9月	
国際誕生	1987年6月	

経口用セフェム系製剤
日本薬局方 セフィキシムカプセル

処方箋医薬品^㉑

セフspan[®]カプセル50mg
セフspan[®]カプセル100mg
セフspan[®]細粒50mg
(セフィキシム細粒)

処方箋医薬品^㉑

〔貯法〕

カプセル：室温保存、気密容器

細粒：室温保存

〔使用期限〕

ケース等に表示（製造後2年）

Cefspan[®] Capsules 50mg・100mg, Fine Granules 50mg

【禁忌（次の患者には投与しないこと）】

本剤の成分によるショックの既往歴のある患者

【原則禁忌（次の患者には投与しないことを原則とするが、特に必要とする場合には慎重に投与すること）】

本剤の成分又はセフェム系抗生物質に対し、過敏症の既往歴のある患者

*【組成・性状】

販売名	セフspanカプセル50mg	セフspanカプセル100mg	セフspan細粒50mg
成分・含量	1カプセル中 日局セフィキシム水和物 50mg (力価)	1カプセル中 日局セフィキシム水和物 100mg (力価)	1g中 日局セフィキシム水和物 50mg (力価)
添加物	カルメロースカルシウム、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸ポリオキシシル40、ステアリン酸マグネシウム、ゼラチン、黄色5号、ラウリル硫酸ナトリウム、酸化チタン		白糖、ヒドロキシプロピルセルロース、トラガント末、オレンジ油、デキストリン、アラビアゴム、黄色5号
剤形・性状	淡いだいだい色不透明の硬カプセル剤		淡いだいだい色の細粒で芳香がある。 味は甘い。
外形			
カプセル号数	5号	4号	
重量(mg)	約90	約160	

【効能・効果】

〈適応菌種〉

本剤に感性のレンサ球菌属、肺炎球菌、淋菌、モラクセラ（ブランハメラ）・カタラーリス、大腸菌、クレブシエラ属、セラチア属、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、プロピデンシア属、インフルエンザ菌

〈適応症〉

急性気管支炎、肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、尿道炎、胆嚢炎、胆管炎、中耳炎、副鼻腔炎、猩紅熱

【用法・用量】

セフspanカプセル50mg及び100mg

通常、成人及び体重30kg以上の小児に対しては、セフィキシムとして1回50～100mg（力価）を1日2回経口投与する。なお、年齢、体重、症状に応じて適宜増減するが、重症又は効果不十分と思われる症例には、セフィキシムとして1回200mg（力価）を1日2回経口投与する。

セフspan細粒50mg

通常、小児に対しては、セフィキシムとして1回1.5～3mg（力価）/kgを1日2回経口投与する。なお、症状に応じて適宜増減するが、重症又は効果不十分と思われる症例には、セフィキシムとして1回6mg（力価）/kgを1日2回経口投与する。

〈用法・用量に関連する使用上の注意〉

- (1) 本剤の使用にあたっては、耐性菌の発現等を防ぐため、原則として感受性を確認し、疾病の治療上必要な最小限の期間の投与にとどめること。
- (2) 高度の腎障害のある患者では血中濃度が持続するので、腎障害の程度に応じて投与量を減量し、投与の間隔をあけて使用すること。〔薬物動態〕の項参照

【使用上の注意】

1. 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）

- (1) ペニシリン系抗生物質に対し、過敏症の既往歴のある患者
- (2) 本人又は両親、兄弟に気管支喘息、発疹、蕁麻疹等のアレルギー症状を起こしやすい体質を有する患者
- (3) 高度の腎障害のある患者（〈用法・用量に関連する使用上の注意〉及び〔薬物動態〕の項参照）
- (4) 経口摂取の不良な患者又は非経口栄養の患者、全身状態の悪い患者〔ビタミンK欠乏症状があらわれることがあるので、観察を十分に行うこと。〕
- (5) 高齢者（〔5. 高齢者への投与〕の項参照）

2. 重要な基本的注意

ショックがあらわれるおそれがあるので、十分な問診を行うこと。

3. 相互作用

併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ワルファリンカリウム	ワルファリンカリウムの作用が増強されるおそれがある。ただし、本剤に関する症例報告はない。	腸内細菌によるビタミンKの産生を抑制することがある。

4. 副作用

総症例12,879例中294例（2.28%）に臨床検査値の異常を含む副作用が認められた。その副作用症状は、下痢等の消化器症状112例（0.87%）、発疹等の皮膚症状29例（0.23%）、また、臨床検査値異常は、ALT（GPT）上昇78例（0.61%）、AST（GOT）上昇58例（0.45%）、好酸球増多26例（0.20%）等であった。
(再審査結果通知：1996年12月)

(1) 重大な副作用

- 1) ショック：ショック（0.1%未満）を起こすことがあるので、観察を十分に行い、不快感、口内異常感、喘鳴、眩暈、便意、耳鳴、発汗等があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- 2) アナフィラキシー様症状：アナフィラキシー様症状（呼吸困難、全身潮紅、血管浮腫、蕁麻疹等）（0.1%未満）があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

- 3)皮膚障害：皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson症候群、0.1%未満）、中毒性表皮壊死症（Lyell症候群、0.1%未満）があらわれることがあるので、観察を十分に行い、発熱、頭痛、関節痛、皮膚や粘膜の紅斑・水疱、皮膚の緊張感・灼熱感・疼痛等が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- 4)血液障害：無顆粒球症（0.1%未満、初期症状：発熱、咽頭痛、頭痛、倦怠感等）、溶血性貧血（0.1%未満、初期症状：発熱、ヘモグロビン尿、貧血症状等）、血小板減少（0.1%未満、初期症状：点状出血、紫斑等）があらわれることがあり、また、他のセフェム系抗生物質で汎血球減少があらわれることが報告されているので、定期的に検査を行うなど観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- 5)腎障害：急性腎不全等の重篤な腎障害（0.1%未満）があらわれることがあるので、定期的に検査を行うなど観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- 6)大腸炎：偽膜性大腸炎等の血便を伴う重篤な大腸炎（0.1%未満）があらわれることがある。腹痛、頻回の下痢があらわれた場合には直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- 7)間質性肺炎、PIE症候群：発熱、咳嗽、呼吸困難、胸部X線異常、好酸球増多等を伴う間質性肺炎、PIE症候群（各0.1%未満）等があらわれることがあるので、このような症状があらわれた場合には投与を中止し、副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。
- 8)肝機能障害、黄疸：AST（GOT）、ALT（GPT）、Al-Pの上昇等を伴う肝機能障害（0.1%未満）、黄疸（0.1%未満）があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

(2)その他の副作用

	0.1～5%未満	0.1%未満
過敏症 ²⁾	発疹、蕁麻疹、紅斑	そう痒、発熱、浮腫
血液	好酸球増多	顆粒球減少
肝臓	AST（GOT）上昇、ALT（GPT）上昇、Al-P上昇	
腎臓		BUN上昇
消化器	下痢、胃部不快感	悪心、嘔吐、腹痛、胸やけ、食欲不振、腹部膨満感、便秘
菌交代症		口内炎、カンジダ症
ビタミン欠乏症		ビタミンK欠乏症状（低プロトロンビン血症、出血傾向等）、ビタミンB群欠乏症状（舌炎、口内炎、食欲不振、神経炎等）
その他		頭痛、めまい

注）発現した場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。

5. 高齢者への投与

高齢者には次の点に注意し、用量並びに投与間隔に留意するなど患者の状態を観察しながら、慎重に投与すること。

- (1)高齢者では生理機能が低下していることが多く、副作用が発現しやすい。
- (2)高齢者ではビタミンK欠乏による出血傾向があらわれることがある。

6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。[妊娠中の投与に関する安全性は確立していない。]

7. 小児等への投与

低出生体重児、新生児に対する安全性は確立していない（使用経験がない）。

8. 臨床検査結果に及ぼす影響

- (1)テストテープ反応を除くベネディクト試薬、フェーリング試薬、クリニテストによる尿糖検査では偽陽性を呈することがあるので注意すること。

- (2)直接クームス試験陽性を呈することがあるので注意すること。

9. 適用上の注意

- (1)カプセル剤交付時：PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。[PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている。]
- (2)細粒剤交付時：牛乳、ジュース等に懸濁したまま放置しないよう注意すること。

10. その他の注意

幼若ラットに経口投与した試験において、1,000mg/kg以上で精子形成抑制作用が発現したとの報告がある。

【薬物動態】

1. 血清中濃度

- (1)健康成人に50、100、200mg（力価）を空腹時1回経口投与すると、約4時間後に最高血清中濃度が得られ、それぞれ0.69、1.13、1.95 μ g/mLであり、血清中濃度半減期は2.3～2.5時間であった。¹⁾腎機能正常な小児患者に1.5、3.0、6.0mg（力価）/kgを1回経口投与したとき、約3～4時間後に最高血清中濃度が得られ、それぞれ1.14、2.01、3.97 μ g/mLで、血清中濃度半減期は3.2～3.7時間であった。²⁾
- (2)中等度腎機能障害群（ $30 \leq Ccr < 60$ mL/min、n = 3）と高度腎機能障害群（ $10 \leq Ccr < 30$ mL/min、n = 4）とで、セフspan（CFIX）100mgを単回服用させて比較した。ピーク値は中等度障害群では投与後6時間で2.04 μ g/mL、高度障害群では投与後8時間で2.27 μ g/mLであり、12時間後の血清中濃度もそれぞれ0.71 μ g/mL、1.83 μ g/mLと高度障害群ほど遷延しており、半減期はそれぞれ4.15時間及び11.05時間であった。³⁾

2. 組織内移行

患者喀痰中⁴⁾、扁桃組織⁵⁾、上顎洞粘膜組織⁶⁾、中耳分泌物⁷⁾、胆汁⁸⁾、胆嚢組織⁸⁾等への移行は良好である。

3. 代謝

ヒトの血清、尿中には抗菌活性代謝物質は認められていない。¹⁾

4. 排泄

主として腎より排泄され、健康成人（空腹時）における50、100、200mg（力価）経口投与時の尿中排泄率（0～12時間）は約20～25%で、最高尿中濃度はそれぞれ42.9（4～6時間）、62.2（4～6時間）、82.7 μ g/mL（4～6時間）であった。¹⁾また、腎機能正常な小児患者における1.5、3.0、6.0mg（力価）/kg経口投与時の尿中排泄率（0～12時間）は約13～20%であった。²⁾

【臨床成績】

1,467例の一般臨床試験における成績概要は次のとおりである。なお、一般臨床試験における1日投与量は主として成人では200mg（力価）（分2）、小児では3.0～9.9mg（力価）/kg（分2～3）であった。また、急性気管支炎⁹⁾、慢性呼吸器病変の二次感染（慢性気管支炎⁹⁾、肺炎¹⁰⁾、複雑性尿路感染症¹¹⁾、中耳炎¹²⁾を対象とした4種類の二重盲検試験において本剤の有効性が認められている。

疾患名		有効例/症例数	有効率（%）
呼吸器感染症	急性気管支炎	118/140	84.3
	肺炎	118/136	86.8
	慢性呼吸器病変の二次感染	145/204	71.1
	慢性気管支炎 気管支拡張症の感染時 慢性呼吸器疾患の二次感染	87/121 29/41 29/42	71.9 70.7 69.0
尿路感染症	膀胱炎	407/503	80.9
	腎盂腎炎	84/107	78.5
	尿道炎（淋菌性尿道炎）	93/101	92.1
胆道感染症	胆嚢炎	18/19	94.7
	胆管炎	20/30	66.7
耳鼻科感染症	中耳炎	116/150	77.3
	副鼻腔炎	30/40	75.0
	猩紅熱	37/37	100
合計		1,186/1,467	80.8

【薬効薬理】

1. 抗菌作用

(1) グラム陽性菌及びグラム陰性菌に広範囲な抗菌スペクトラムを有し、特にグラム陽性菌ではレンサ球菌属、肺炎球菌、グラム陰性菌では淋菌、モラクセラ(ブランハマラ)・カタラーリス、大腸菌、クレブシエラ属、セラチア属、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、プロビデンシア属、インフルエンザ菌等に対して他の経口用セフェム剤よりも強い抗菌力を示し、その作用は殺菌的である。^{13)~18)}

(2) 各種細菌の産生する β -lactamaseに極めて安定で、 β -lactamase産生菌にも優れた抗菌力を示す。¹³⁾¹⁵⁾¹⁹⁾²⁰⁾

2. 作用機序

作用機序は細菌細胞壁の合成阻害であり、その作用点は菌種により異なるが、ペニシリン結合蛋白(PBP)の1(1a、1b、1c)及び3に親和性が高い。¹⁴⁾¹⁹⁾²⁰⁾

【有効成分に関する理化学的知見】


一般名：セフィキシム水和物 (Cefixime Hydrate) 略号：CFIX
化学名：(6R, 7R)-7-[(Z)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-(carboxymethoxyimino)acetylamino]-8-oxo-3-vinyl-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid trihydrate

分子式：C₁₆H₁₅N₅O₇S₂ · 3H₂O

分子量：507.50

融点：約240°C (分解)

構造式：



性状：セフィキシム水和物は白色～淡黄色の結晶性の粉末である。

メタノール又はジメチルスルホキシドに溶けやすく、エタノール(99.5)にやや溶けにくく、水にほとんど溶けない。

分配係数： 2.9×10^{-3} (1-オクタノール/水系)

【包装】

セフspanカプセル50mg

PTP：100カプセル (10カプセル×10)

セフspanカプセル100mg

PTP：100カプセル (10カプセル×10)

セフspan細粒50mg

バラ：100g

分包：1g×120

【主要文献】

- 1) Nakashima, M. et al. : J. Clin. Pharmacol. 27(5) : 425, 1987 [CSP-00173]
- 2) Jpn. J. Antibiot. 39(4) : 1986 Cefixime特集号より集計
- 3) 前田浩志 他 : Jpn. J. Antibiot. 39(10) : 2716, 1986 [CSP-00145]
- 4) 林 泉 他 : 日本化学療法学会雑誌 33(S-6) : 253, 1985 [CSP-00049]
- 5) 藤巻 豊 他 : 日本化学療法学会雑誌 33(S-6) : 796, 1985 [CSP-00092]
- 6) 木下治二 他 : 日本化学療法学会雑誌 33(S-6) : 817, 1985 [CSP-00094]
- 7) 大西信治郎 他 : 日本化学療法学会雑誌 33(S-6) : 807, 1985 [CSP-00093]
- 8) 谷村 弘 他 : 日本化学療法学会雑誌 33(S-6) : 499, 1985 [CSP-00075]
- 9) 今野 淳 他 : 日本化学療法学会雑誌 34(11) : 1150, 1986 [CSP-00146]
- 10) 今野 淳 他 : 日本化学療法学会雑誌 34(11) : 1184, 1986 [CSP-00147]
- 11) 荒川創一 他 : 西日本泌尿器科 48(2) : 645, 1986 [CSP-00112]
- 12) 馬場駿吉 他 : Jpn. J. Antibiot. 40(1) : 1, 1987 [CSP-00154]
- 13) 井上松久 他 : 日本化学療法学会雑誌 33(S-6) : 1, 1985 [CSP-00023]

14) 横田 健 他 : 日本化学療法学会雑誌 33(S-6) : 13, 1985 [CSP-00024]

15) 高島瑛智子 他 : 日本化学療法学会雑誌 33(S-6) : 29, 1985 [CSP-00026]

16) 西野武志 他 : 日本化学療法学会雑誌 33(S-6) : 75, 1985 [CSP-00030]

17) 上村利明 他 : 日本化学療法学会雑誌 33(S-6) : 109, 1985 [CSP-00033]

18) 星野和夫 他 : Pharma Med. 20(9) : 213, 2002 [CSP-01445]

19) 小川道雄 他 : 日本化学療法学会雑誌 33(S-6) : 103, 1985 [CSP-00032]

20) 松本佳巳 他 : 日本化学療法学会雑誌 33(S-6) : 123, 1985 [CSP-00034]

*【文献請求先】

日本ジェネリック株式会社 お客様相談室
〒100-6739 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
TEL 0120-893-170 FAX 0120-893-172

®登録商標

*販売元



日本ジェネリック株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

製造販売元



長生堂製薬株式会社
徳島市市府町府中92番地